



Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia
"Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

Cod. Mecc NAIC839007

E.M. naic839007@istruzione.it

C.F. 91006040637

**Alle Unità di Primo Soccorso
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"**

LORO SEDI

OGGETTO: *protocollo per gestione crisi tonico-clonica.*

Il Dirigente Scolastico

RILEVATA

- ❑ la presenza, all'interno della platea scolastica di competenza, di soggetti affetti di epilessia

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ il D.l. 25 novembre 2005;
- ❑ le linee guida contro l'epilessia della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l' Epilessia)

RESTITUISCE

i seguenti Principi generali di comportamento per l'assistenza nel caso di crisi tonico-clonica generalizzata:

- ❑ l'addetto al primo soccorso scolastico, prima dell'intervento, deve indossare dpi per la protezione delle mani e della bocca;
- ❑ il secondo addetto al primo soccorso scolastico deve inoltrare chiamata di emergenza al 118 indicando:
 - ❑ se si tratta di una prima crisi o se si verifica in corso di un evento acuto (es. trauma cranico, febbre,..)
 - ❑ se la crisi dura più a lungo del comune (2-3 minuti);
 - ❑ se la persona tarda a riprendere coscienza (>5 minuti);

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BARANO D'ISCHIA "ANNA BALDINO"

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

- se le crisi si ripetono;
- se la persona si è procurata lesioni;
- se la persona respira con difficoltà o ha problemi respiratori;
- durante la crisi:
 - proteggere da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi;
 - aiutare a respirare slacciando indumenti stretti;
 - rimanere vicino al soggetto in crisi ed osservarlo per poter descrivere crisi e relativa durata;
 - non cercare di: rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e introdurre qualcosa tra i denti, dare qualcosa da bere, praticare la respirazione artificiale;
- dopo la crisi:
 - posizionare la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla bocca);
 - togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione;
 - restare accanto alla persona finché è confusa e proteggerla;
 - non contenere e non somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto niente per bocca finché la persona non ha ripreso coscienza;
 - rassicurare utilizzando calma, persuasione, sostegno.

Resta a disposizione per eventuali approfondimenti e gradisce l'occasione per augurare buon lavoro.

